

Определение тяжести заболевания у детей¹



Степень тяжести дегидратации в процентах от массы тела ребенка до заболевания

Легкая (I)

Средняя (II)

Тяжелая (III)

4–5 %

6–9 %

≥ 10 %

Признаки	Баллы		
	0	1	2
Внешний вид	Нормальный	Жажда, беспокойство, раздражительность	Вялость, сонливость
Глазные яблоки	Тургор нормальный	Слегка запавшие	Запавшие
Слизистые оболочки	Влажные	Липкие, суховатые	Сухие
Слезотечение	Норма	Снижение	Отсутствует

0 баллов

дегидратация отсутствует

1–4 баллов

легкая дегидратация

5–8 баллов

дегидратация средней и тяжелой степени

Пероральная регидратация проводится в два этапа¹:

1

Этап:

- Дегидратация I степени – **40–50 мл/кг массы тела** за первые шесть часов.
- Дегидратации II степени – **80–90 мл/кг массы тела** за первые шесть часов.

2

Этап:

- Последующие шестичасовые отрезки – количество раствора должно соответствовать **потерям жидкости с испражнениями и рвотными массами за предыдущие 6 часов.**
- Этап продолжается **до прекращения диареи.**
- Ориентировочный объем раствора для поддерживающей регидратации – **от 80 до 100 мл/кг массы тела в сутки** (при массе не более 25 кг).